

## **BANCO DE PREGUNTAS**

### **BUCEO EN ALTITUD**

#### **BUCEO DEPORTIVO AVANZADO**

##### **BÁSICAS**

1. Después de una inmersión única se recomienda antes de volar un intervalo mínimo en superficie de:
  - A) 18 horas.
  - B) 12 horas.
  - C) 36 horas.
  - D) 24 horas.
2. Después de inmersiones sucesivas durante varios días se recomienda antes de volar un intervalo mínimo en superficie de:
  - A) 18 horas.
  - B) 12 horas.
  - C) 15 horas.
  - D) 72 horas.
3. Después de una inmersión que requiera paradas de descompresión se recomienda antes de volar un intervalo de superficie mínimo de:
  - A) 18 horas.
  - B) 12 horas.
  - C) 24 horas.
  - D) 72 horas.
4. Nombre dos afecciones fisiológicas posibles en altitud no incluyendo las enfermedades descompresivas
  - A) Intoxicación por monóxido y por oxígeno.
  - B) Hipoxia e intoxicación por monóxido.
  - C) Hipotermia e intoxicación por oxígeno.
  - D) Hipoxia e hipotermia.
5. En los profundímetro de tubo bourdon ¿De qué manera afecta la altitud?
  - A) Marca una profundidad mayor a la real.
  - B) Marca una profundidad menor a la real.
  - C) Marca una profundidad exacta a la real.
  - D) Marca de acuerdo a la temperatura del lugar.
6. Se considera buceo en altitud desde:
  - A) 200 metros.
  - B) 250 metros.
  - C) 300 metros.
  - D) 400 metros.

7. Para efectos de cálculos de altitud la presión atmosférica será:
- A) 780 mm.hg.
  - B) 760 mm.hg.
  - C) 640 mm.hg.
  - D) 1020 mm.hg.
8. La profundidad máxima de cualquier inmersión en altitud es?
- A) La profundidad real de 40 mts.
  - B) La profundidad teórica de 40 mts
  - C) La profundidad teórica de 20 mts.
  - C) La profundidad real de 30 mts.